



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام
مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)
واحد آموزش به بیمار



همکار محترم پرستاری بهارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بهار، الزامی است آموزش بهار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

پزشک یا پزشکان معالج:	نام بیماری: سندرم های رایج حین دیالیز 2/1
نام و نام خانوادگی بیمار:	تاریخ ترخیص:
جهت دریافت جواب در تاریخ / به واحد مراجعه فرمایید	
<p>❖ عوارض همودیالیز</p> <p>در زمان انجام دیالیز ممکن است عوارض و علائمی ایجاد شود که برخی شایع و برخی بصورت نادر مشاهده می شود. عوارض شایع عبارتند از:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ کاهش فشارخون ✓ گرفتگی عضلات ✓ تهوع و استفراغ ✓ سردرد ✓ درد سینه و کمردرد ✓ خارش ✓ تب و لرز <p>عوارض نا شایع در هنگام دیالیز عبارتند از:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ واکنش یا حساسیت به دیالیز ✓ همولیز یا لیز شدن گلبول های قرمز ✓ آمبولی هوا 	
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد کاهش فشارخون</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ در صورتی که علائم و نشانه های کاهش فشار خون را داشتید به پرستار خود اطلاع دهید تا فشارخون شما را کنترل کند در صورت کم بودن فشار خون اقدام درمانی مناسب را انجام دهد. ✓ از آن جایی که امکان افزایش وزن در مدت زمان بین دو دیالیز وجود دارد باید افزایش وزن در بین دو دیالیز را کنترل کنید، افزایش وزن در هر روز باید کمتر از یک کیلو باشد. ✓ اگر داروی ضد فشار خون می خورید، بعد از دیالیز آن را مصرف کنید. ✓ در حین دیالیز، غذا یا مواد خوراکی نخورید. ✓ در صورت عدم ایجاد مشکل تنفسی طوری بخوابید که پا کمی بالاتر از سر قرار گیرد. ✓ ممکن است به شما 100 سی سی یا بیشتر سرم نمکی تزریق گردد. ✓ در صورتی که افت فشارخون زیاد باشد، دیالیز قطع می شود. ✓ برای شما لوله یا ماسک اکسیژن گذاشته می شود. ✓ به منظور کاهش فشار خون حین دیالیز دمای محلول دیالیز به 34 تا 36 درجه کاهش می یابد. 	
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد گرفتگی عضلانی</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ در صورتی که علت این عارضه کاهش فشار خون باشد اقدامات زمان افت فشارخون که در قسمت قبل توضیح داده شد انجام دهید. ✓ به پرستار خود اطلاع دهید تا درمان مناسب برای شما انجام گردد. ✓ اگر دیابت نداشته باشید ممکن است به شما 50 سی سی گلوکز 50٪ یا برخی داروها با نظر پزشک تزریق شود. ✓ با مصرف اگزازپام 5 یا 10 میلی گرم با نظر پزشک دو ساعت قبل از انجام دیالیز این عارضه کاهش می یابد. ✓ مصرف چربی های خوراکی را کاهش دهید. ✓ میزان قند مصرفی را کاهش دهید. از مصرف نوشابه و الکل خودداری کنید. ✓ از کمپرس گرم و ماساژ اندام استفاده کنید. 	
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد تهوع و استفراغ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ در صورتی که علت این عارضه کاهش فشار خون باشد اقدامات زمان افت فشارخون که در قسمت قبل توضیح داده شد انجام دهید. ✓ به آرامی دراز بکشید و آرامش خود را حفظ نمایید. ✓ به پرستار خود اطلاع دهید تا درمان مناسب برای شما انجام گردد. ✓ می توانید با نظر پزشک قبل از انجام دیالیز متوکلوپرامید مصرف کنید. ✓ از خوردن و آشامیدن در زمان انجام دیالیز خودداری نمایید. 	

حین بستری



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام
مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)
واحد آموزش به بیمار



هنگام محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بهار، الزامی است آموزش بهار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

نام بیماری: سندرم های رایج حین دیالیز 2/2	پزشک یا پزشکان معالج:	نام و نام خانوادگی بیمار:			
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد خارش</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ از اجسام زیر برای خاراندن پوست استفاده نکنید. ✓ برای جلوگیری از خشکی پوست از حمام کردن زیاد و استفاده از صابون های معطر خودداری کنید. ✓ در زمان استحمام از صابون های ملایم استفاده نموده و از کیسه کشیدن زیاد پوست اجتناب نمایید. ✓ پوست را با نرم کننده و مرطوب کننده های پوست مرطوب نگه دارید. ✓ از قرارگیری در محیط هایی با درجه حرارت خیلی بالا و یا پایین خودداری کنید. ✓ رژیم غذایی با محدودیت فسفر را رعایت فرمایید. ✓ داروهای ضد خارش تجویز شده را مصرف نمایید. ✓ ناخن های خود را همیشه کوتاه نگه دارید. ✓ در صورت داشتن خارش از پارچه تمیز و نرم جهت این کار استفاده نمایید. ✓ از آب گرم برای حمام استفاده نکنید ✓ از پوشیدن لباس های پشمی و نایلونی خودداری نمایید. ✓ از لباس های نرم و پنبه ای استفاده نمایید. 					
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد سردرد</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ می توانید از استامینوفن به صورت خوراکی استفاده نمایید. ✓ نوشیدن یک فنجان چای و یا قهوه پس از انجام دیالیز برای کاهش سردرد موثر می باشد. ✓ در صورتی که سردرد شدید بود به متخصص داخلی اعصاب مراجعه نمایید. 					
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد تب و لرز</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ در صورت تب بالا از استامینوفن خوراکی می توانید استفاده نمایید. ✓ از ارتباط با افرادی که دارای عفونت می باشند خودداری نمایید. ✓ در زمان ایجاد تب پوشش و یا لباس های خود را کم نمایید. 					
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد واکنش یا حساسیت به محلول دیالیز</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ انجام دیالیز قطع شده و از بازگشت خون موجود در دستگاه دیالیز به بدن جلوگیری می شود. ✓ به شما داروهایی مانند آنتی هیستامین و ... داده می شود. ✓ برای شما لوله یا ماسک اکسیژن گذاشته می شود. 					
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد سندرم عدم تعادل در دیالیز</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ شما به تنهایی نمی تواند به این سندرم پی ببرید و پرستاران و پزشکانی که در مراکز دیالیز کار می کنند با دیدن علائم به سرعت به وجود این سندرم پی می برند. فردی که دارای این سندرم است به صورت ناگهانی دچار سردرد، تهوع، استفراغ، بی قراری شدید و لرزش می شود. زمانی که پرستاری این علائم را در بیماری مشاهده کند به سرعت اقدامات درمانی را آغاز می کند. ✓ تشنج می تواند در افرادی که دارای وزن کم هستند دیده شود اما در تمام بیماران امکان تشنج وجود دارد. زمانی که این تشنج اتفاق افتاد می توان با تزریق سرم سدیم یا مانیتور بیمار را به حالت اولیه برگرداند و در صورتی که تشنج شدید باشد دیالیز باید قطع شود و بعد از چند ساعت به صورت آهسته دیالیز را آغاز کنند. ✓ به موقع برای انجام همودیالیز مراجعه کنید و نوبت دیالیز را به تعویق نیندازید. 					
<p>❖ اقدامات زمان ایجاد آمبولی هوا</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ در صورت ایجاد علائم به پرستار خود اطلاع دهید تا اقدامات مناسب برای شما انجام شود. ✓ انجام دیالیز در زمان ایجاد این عارضه قطع می گردد. ✓ بیمار به پهلو چپ در حالتی که سر پایینتر و پاها بالاتر باشد خوابانده می شود. ✓ اکسیژن ۱۰۰٪ با ماسک داده می شود. ✓ به ناحیه دو کتف ضربه وارد می شود. 					
نام دارو	مقدار	ساعت مصرف	ارتباط با غذا		توجهات ویژه
		صبح	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
		صبح	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
		صبح	قبل از غذا	بعد از غذا	همراه غذا
به منظور افزایش آگاهی و رضایتمندی مراجعه کنندگان عزیز، درخواست می شود نظرات اصلاحی خود را به سوپروایزر آموزشی واقع در دفتر پرستاری اعلام کنید					
نام و نام خانوادگی بیمار یا همراه وی امضاء		مهر و امضاء پرستار		مهر و امضاء پزشک	

دکتر بهاره غیائی فوق تخصص نفرولوژی ادرس مطب صبح : کلینیک فجر انقلاب
عصر: روبروی بیمارستان امام خمینی - ساختمان اسبیا

دکتر رضا اسدزاده فوق تخصص نفرولوژی ادرس مطب صبح : کلینیک فجر انقلاب
عصر: سعدی جنوبی - روبروی داروخانه دکتر رشیدی

دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری و زمان ترخیص



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ایلام
مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)
واحد آموزش به بیمار



همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خود مراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص، طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

دستورالعمل و راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری و زمان ترخیص